

Инструкция по применению

Аципол капсулы

Препарат представляет собой лиофилизированную в среде культивирования смесь микробной массы живых антагонистически активных ацидофильных лактобацилл и инактивированных прогреванием кефирных грибков, содержащих водорастворимый полисахарид, подвергнутых измельчению, расфасованную в капсулы.

В 1 капсуле содержится не менее 10⁷ живых ацидофильных лактобацилл и полисахарида кефирного грибка – 0,4 мг.

Содержимое капсул – сухая биомасса от светло-кремового до кремового цвета с кисломолочным запахом.

Биологические свойства

Терапевтический эффект Аципола определяют содержащиеся в нем живые ацидофильные лактобациллы и полисахарид кефирных грибков. По механизму действия Аципол является многофакторным лечебным средством, обладает антагонистической активностью в отношении патогенных и условнопатогенных микроорганизмов, оказывает корректирующее действие на микрофлору кишечника, повышает иммунологическую реактивность организма.

Назначение

Профилактика и лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта, у детей с 3-х месячного возраста и взрослых; в сочетании с традиционным лечением.

Показания к применению

Дисбактериоз и состояния, приводящие к его развитию:

- острые кишечные инфекции (дизентерия, сальмонеллез, ротавирусный гастроэнтерит и др.);
- хронические колиты, энтероколиты инфекционного и неинфекционного происхождения;
- длительная антибактериальная терапия.

Дисбактериоз и отставание в весе, связанные с:

- активной антибиотикотерапией гнойно-септических заболеваний у грудных детей;
- хроническими, затяжными, рецидивирующими патологиями органов дыхания (бронхиты, пневмонии, в том числе пневмоцистные);
- атопическим дерматитом и другими аллергическими проявлениями.

Профилактика дисбактериоза.

- Повышение общей резистентности организма.

Способ применения и дозировка

Капсулы применяют внутрь, не разжевывая, запивают кипяченой водой.

Размер суточной дозы и продолжительность лечения больных определяет врач в зависимости от возраста, тяжести и длительности заболевания и выраженности дисбактериоза.

Детям от 3-х месячного до 3-х лет Аципол следует принимать вместе с пищей по 1 капсуле 2-3 раза в сутки, предварительно вскрыв капсулу и растворив ее содержимое в молоке или кипяченой воде.

Остальным возрастным группам и взрослым Аципол следует применять по 1 капсуле 3-4 раза в сутки за 30 минут до приема пищи.

При острых кишечных инфекциях препарат назначают в течение 5-8 дней.

Более длительные курсы назначают при лечении детей с отставанием в весе, вызванное хроническим течением заболеваний, сопровождающихся дисбактериозом.

С профилактической целью Аципол назначают по 1 капсуле 1 раз в сутки в течение 10-15 дней.

Повторные курсы проводят не ранее 1 месяца после окончания предыдущего лечения.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные действия

Не установлены.

Форма выпуска

По 20 или 30 капсул в банках полимерных.

По 10 капсул в односторонней ячейковой контурной упаковке.

1 полимерная банка или 1, 2 или 3 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

Срок годности. Условия хранения и транспортирования

Срок годности – 2 года.

Хранение и транспортирование в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре не выше 10С.

Условия отпуска из аптек

Отпускается без рецепта.

Не пригоден для применения:

- препарат, целостность внутренней упаковки которого нарушена (треснувшие банки, блистерная упаковка);
- препарат без маркировки или с нечеткой маркировкой;
- препарат с измененными физическими свойствами (нарушена форма капсулы), при наличии посторонних включений;
- препарат с истекшим сроком годности.

Рекламации на препарат следует направлять в ФГУН Государственный научно-исследовательский институт стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов им. Л.А.Тарасевича Роспотребнадзора по адресу: 119002, Москва, ул. Сивцев Вражек, 41, тел. (495) 241-39-22; факс (495) 241-92-38, а также по адресу предприятия, изготовившего препарат - ЗАО «Фармацевтическая фирма «ЛЕККО»: 601125, Владимирская обл., Петушинский р-н, п.Вольгинский, телефон: (49243) 71-5-52, телефон/факс: (49243) 71-6-74.

Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению или получить консультацию специалиста.